

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋寶太師瘡瘍經驗全書卷之二目錄

宋燕山寶漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

發腦圖說

方一

頭後蜂窠散注圖說

枕疽圖說

腦疽圖說

方二

對口瘡圖說

方二

兩邊髮際發

圖說

面發毒圖說

方三

寒瘡圖說

方一

癰癰圖說

方三

神效灸癰癰穴法圖說

方十

風毒發疽圖說

方二

頂門癰圖說

方三

眉風毒圖說

方二

發眉瘡圖說

方一

上下眼丹圖說

方三

發鬚毒圖說

方五

鬚疽圖說

方二

疔腮毒圖說

方二

耳風毒圖說

方三

耳門癰耳根癰圖說

發耳圖說

項疽毒圖說

方二

風毒頸癰圖說

方一

發頤毒圖說

方三

穿腮圖說

方四

頰癰圖說

面風毒圖說

發鬚發髭圖說

方一

鬚發毒圖說

石疽圖說

方一

頰疽圖說

方三

漏睛瘡圖說

方二

鴉喙瘡圖說

方一


鰓唇圖說

方三

第二卷目錄畢

重校宋寶太師瘡瘍經驗全書卷之二

圖論方  
發腦



此發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在風池之穴或多或少大小不同形如硬癰漸至潰爛遍生髮中痛如刀刺赤腫無膿逆則黃水出順有白膿來治法以當歸川芎人參赤芍連翹桔梗天花粉升麻酒炒黃芩山梔金銀花黃芪乾葛之類以意消息治之外用紫金錠水磨搽之或大者以膏藥貼之一日三次宜服蠟礬丸


蜈蚣不拘多少和葱搗爛絞汁加冰片射香少許搽之

頭後蜂窠散注



此症發于頭後如是蜂窠者急宜救之若焮赤腫痛起者得療痰發者必難治矣急用調治之若或流于兩肩者決不可療也治法與發胸者同


枕疽





此毒蓋因風熱上攻入於內發此疽疾量人年紀老少  
用藥人年五十以上難治少壯可治更服內疎黃連湯  
十數貼加 羌活 金銀花 荊芥 千金托裏散  
宜服黃黎丸 外貼金絲膏治法與對口瘡同

腦疽




此毒受在腎藏虛實熱壅上腦戶結伏成毒也初起三

日者剃去髮以艾炷如豆大者灸五壯外用圍藥庶能消矣當用三香內托散定痛消毒飲治之

人參 當歸 升麻 川芎 白芍 桔梗 枳殼  
茯苓 半夏 柴胡 甘草 羌活 防風 厚朴  
白芷 天花粉 右剉薑三片燈心三十莖空心服  
三香內托散

人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇 枳殼  
官桂 烏藥 白芍 白芷 川芎 防風 乳香  
薑三棗二水煎不拘時服 上中下三搭手俱用此

對口瘡



此毒因虛陽上攻熱入下腦故生此疽正近咽喉之所

諸陽之會間速宜調治初起用千金內托散加

羌活 獨活 柴胡 天花粉 煎服先散其虛熱  
之氣然後服荊防敗毒散 外貼金絲膏

更服內托十宣散加 白芍 羌活 金銀花煎服  
多服蠟礬丸護心散

### 圍藥

雄黃末 二錢 白芨末 一兩 和勻用蟹搗汁調敷留孔  
時用水潤之

另有圍藥方在頂門瘡中取用

兩邊髮際發



此證生頸後兩邊左右鬢髮邊發生急宜救之如核硬而發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上攻于腦四畔邊炊赤腫硬連于耳項寒熱疼痛若不急療毒入血肉腐壞為膿水頭中出血者氣喘及痰發者難治治法同前宜加減用引經藥

面發毒





此症之發多起于房勞太過乘虛風入經絡陽明經虛  
發于面也或面生癰癰患者欲求速愈而庸醫或以毒  
藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯戾神惡宿  
或破後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服  
金石草木諸部惡毒相攻相反之劑以致病症日劇殊  
不知而為諸陽之首禁火禁刀禁毒况耳目口鼻之官  
總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面為  
陽火氣入之薰蒸肌肉刀針刺之即傷經絡毒藥點之  
暴剥皮肉轉轉為患繼之以風邪入之則頭面虛腫目

鼻腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作嘔  
楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清涼拔毒  
之藥內服參朮內托之劑每合犀角鬱金散服之以拔  
積毒其命方可保也否則難生  
清涼拔毒散

白芨 雄黃 射香 乳香 山茨菇 天花粉  
黃栢 烏藥

右為末鷄子清調付蜜水潤之

參朮內托散

人參 白朮 粉草 犀角 貝母 黃連 防風  
黃芩 酒炒 羌活 桔梗 當歸 生地 白芍 前胡  
天花粉


因病之逆從而加減之 水二鍾薑三片煎服

犀角鬱金散

犀角 鬱金 真珠 牛黃 粉草 乳香 真粉  
辰砂

煉蜜為丸嚥化

寒瘡



一人面上及遍身生瘡似猫眼有光彩無膿血冬則近  
脛名曰寒瘡此乃脾家濕熱所化宜服雄黃解毒丸再  
服清肌滲濕湯多食魚雞葱韭而愈惟鯉鮎魚蝦蟹不  
可食

清肌滲濕湯

蒼朮	白朮	升麻	甘草	澤瀉	山梔	黃連
厚朴	茯苓	當歸	川芎	青皮	木通	苦參
車前子	小柴胡					

源癰



此症手少陽三焦經主之大抵二經多氣少血因驚憂

思慮故生此疾初起生于耳下及項間并頤舍下至缺  
盆在鎖子骨陷隱隱皮膚之內初生如豆漸長如李核  
之狀或一粒或三五粒按之則動而微痛不發熱惟午  
后微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠則堅而不潰  
潰而不合皆因氣血不足徃徃變為勞瘵自瘵紅腫或  
上或下或左或右連串三五箇破潰遍項漸流膿血致  
成瘰癧獨形者為結核續欲連結者為瘰癧但此症原  
不係膏粱之變因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥  
治之其瘡自消若金石暴悍之劑血氣愈損不能生矣

若不速治必致喪生

益氣養榮湯 治抑鬱及勞傷氣血頭項或四肢腫硬  
或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治之大  
効

人參

錢一

白朮

錢二

茯苓

陳皮

貝母

當歸

川芎

黃芪

熟地

白芍

桔梗

甘草

香附

米

各一錢

右作一劑水二鍾煎八分食遠服

胸痞滿人參地黃各減三分

口乾

加五味子

麥冬

往來寒熱

加小柴胡

地骨皮

膿清

倍加

人參

黃芪



膿多加川芎當歸 膿不止加人參黃芪當歸貝母  
肌肉遲生加白鯁官桂

馬刀瘡與癰癰同條少陽膽經之此二經亦多氣少血  
或在耳之前后或在耳下連及頤頤或在胸及胃側或  
在兩脇久堅不潰皆謂之馬刀瘡也故多堅少軟膿白  
如稀糊似泔水狀治者求水清可也形表如蛤者為馬  
刀瘡

夏枯草湯 癰癰馬刀瘡不問已潰未潰或久成漏並  
宜服之

夏枯草六兩水三碗煎至一碗去查食遠服此生血  
補虛清毒之聖藥濃煎膏并塗患處多服十全大補  
湯加貝母香附遠志

治療癰已成未成已潰未潰以手置有上微舉起則肘  
骨尖自現是灸處如患左灸左肘患右灸右肘若左右  
俱患兩肘皆灸以三十四壯為期更服補劑一年灸  
一次三灸其瘡自除如患三四年不愈者辰時灸起至  
酉時方止三灸即愈更服益氣養榮湯

又方灸法未成膿者用大蒜切片如二錢厚者安患上

用艾炷于蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十數蒜片以拔鬱毒如破久不合內有核或瘀肉此因氣血不足不能腐爛更用江西豆豉為末唾津和為餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼金絲膏瘡口自合矣  
癰瘡痰核噤藥

昆布

酒洗

海藻

酒洗

大黃

酒拌蒸

殭蚕

姜汁炒

青黛各二錢

桔梗

一錢

連翹

二錢

胆星

二錢

柴胡

片苓

酒炒

橘紅

黃連

酒炒

瓜蒌

各一錢

右為末煉蜜丸如芡實大不拘日夜噙之

神効灸治療癰穴法



二鼠尾穴在手臂上大肉處是穴

治男子婦人小兒患此症者依此四六燒灸無不効肩  
骨尾盡處是肩井二穴左肩灸左右肩灸右左右俱有  
俱灸鼠尾一穴用草一莖男比左手女比右手甲節橫  
紋攢量過四指紋盡處比交折斷將至絲螺骨尖中比  
至脚后摠筋中是穴鼠尾左灸左右灸右俱有俱灸一  
年五壯年深多灸專治一切發者須要禁忌房事神効  
不虛可以活人灸畢瘡爛車前草葉搗爛貼之看遍身  
神人所在禁忌并擇天醫黃道吉日

灸忌 既灸忌諸魚熱麵生酒生冷物鮮肉及房勞

又灸兩手掌后四寸兩筋間各七壯以病人中指橫紋量至本指尖為四寸再灸肘尖左病灸右右病灸左各三壯不過三次除根

如神散 瘰癧已破瘡口不合

松香末一兩 白礬三錢 為細末油調搽乾摻亦可

散腫潰堅丸 瘰癧馬刀服益氣養榮湯不能消散者

宜服此丸五日再服益氣湯五日相兼服之

知母 黃栢 廣茂 天花粉俱酒拌炒 昆布酒炒 連翹

黃連炒 葛根 白芍 京三稜各三錢炒 升麻 當歸梢

甘草

小柴胡各一兩

草龍膽

四兩

黃芩

一錢五分一半生用一半酒炒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸白沸湯送下

神祕散

服散堅九益氣湯不愈宜進此藥再服益氣

湯

斑猫

甘草枝去頭足翅同糯米炒去米不用為末

荊芥穗二錢

黑牽牛末一錢

疆蚕末二錢炙

和勻每服二錢五更溫酒調下日午惡物從小便中出如小便澀或痛以葱白湯飲之或木通湯更以米

粥補之若不下明早五更再服以下為度無力者不  
可下每早服之五早為度

得効針頭散 追蝕惡瘡瘰肉

赤石脂

解乳香

白丁香

各二錢

砒

生用

黃丹

各一錢

輕粉

七分

射香

三錢

蜈蚣

一條炙

右為末摻于瘰肉上或瘡口小就搽瘡口上瘰肉自  
去更以膏藥貼之肉亦去嘗用砒末二錢以白礬末  
二錢和勻同火上飛過用礬一錢合藥亦効但不及  
生砒之功速耳



柴胡連翹湯 治馬刀瘡

小柴胡錢五 鼠粘子錢二 薄桂五錢 連翹五錢 瞿麥穗六錢

炙草三錢 生地三錢 婦尾一錢五分 黃柏三錢酒炒 知母三錢

黃芩酒炒 右勻作四劑水煎服之

消毒湯 治馬刀瘡

柴胡二錢 連翹二錢 婦尾一錢 紅花一錢 甘草一錢

生芩二錢 黃連五分 天花粉錢二 鼠粘子五分炒 黃芪二錢

柴胡通經湯 小兒項側有瘡堅而不潰亦名馬刀瘡

柴胡 連翹 當歸尾 黃連 黃芩

生甘草 鼠粘子 桔梗 三稜 紅花

川芎 水煎服

必効散 治療癰

朋砂二錢五分 輕粉 一錢 射香五分 檳榔 一枚 斑蝥四十去頭足翅

巴豆五枚去皮心膜

右同研末取鷄子清二枚去黃調藥勻傾在鷄子殼內濕綿紙數層糊定勿令透氣飯上蒸熟取藥晒干研末用時看病人虛實虛者用五分實者用一錢並用煨熟老薑煎酒五更空心調下天明取下惡物如

小腹內疼痛便用天麻子燒灰一錢沒藥一錢同研  
為細末茶清調下一錢取下惡物或如爛肉或如初  
出老鼠或新成卵內雀兒是藥効驗婦人有孕不可  
服

治頸上痰核飲之半月即效

青木香根葉

獨脚將軍草各二斤

右用大酒十斤放二味在瓶內封固瓶口重湯煮  
三枝官香為度埋地中三日出火毒飲之

立消紅腫痰核

用石灰窯內紅土整為土不菜油調搽空  
中出毒出膿以膏藥貼之

風毒發疔



此瘡受在氣血不通凝滯脾胃有傷經絡或過食炙燂  
或被毒氣聚結成瘡或乘虛為賊風所吹當用溫中順  
氣飲 順氣飲孕婦加減服

溫中順氣飲

生地

茯苓

厚朴

白朮

甘草

青皮

枳殼

桔梗

當歸

川芎

防風

木香

白芍

蓬朮

右用薑三片棗二枚煎服不拘時

若孕婦去蓬朮厚朴加砂仁陳皮

頂門癭



此寇受在六府與陰陽不調氣上熱壅而成癰毒傷于腦經于是毒症不可輕忽先用敗毒流氣飲後服內托流氣飲治之

外用救苦拔毒膏

雄蜈蚣一二條和葱白二寸搗極爛加雄黃末一錢白芨末一錢和勻敷患處留孔乾用水潤之何為雄蜈蚣背上有白紋者是也對口瘡發鬚發疽之症亦治

用敗毒流氣飲

人參

乾葛

枳殼

桔梗

甘草

柴胡

防風

細辛

薄荷

川芎

羌活

芍藥

獨活

白芷

紫蘇

天花粉

薑三片棗一枚水煎食後服

不消用內托流氣飲

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

官桂

冬加檳榔

烏藥

枳殼

當歸

川芎

芍藥

白芷



薑三片棗二枚煎服

或熱加柴胡黃芩去官桂

或痛加玄胡索五靈脂乳香

或瀉痢加附子人參白朮土炒澤瀉

胃氣不順加陳皮茯苓半夏山藥

嘔吐加生薑藿香

眉風毒



此毒受在肝經氣血上壅結聚成毒常用敗毒流氣飲

內托流氣飲清肝飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇 桔梗 生地 薄荷 青皮 枳殼 甘草

防風 川芎 羌活 前胡 連翹 芍藥 小柴胡

內托清肝飲

人參 黃芪 厚朴 甘草 防風 桔梗 天花粉

枳殼 藥木 升麻 烏藥 當歸 白芍 金銀花

白芷 川芎 蕪三片 棗一枚 煎服

園藥用頂門煎救苦長壽膏治之如無藥用急用金箱

發眉瘡



發眉瘡從眉至頭生瘡色黑其腰漸漸腫氣浮滿面其瘡如石針刺無膿其水自出痛不可忍悶亂嘔逆者正是此瘡六日可刺出膿如吐逆心悶漸減可治如不能減男子二十四日而殞女子七日而終矣急用止疼之藥治之

止痛拔毒散 升麻 甘草節 鼠粘子 乳香 山梔

黃連 歸須 川芎 白芍 生地 桃仁

黃芩 羌活 獨活 桔梗 白芷 青皮

蟬殼 連翹 金銀花 宜搽紫金錠 服護心散

上下眼丹



此毒受在心肝氣毒上攻壅而聚此丹毒當用清心流

氣飲治之兼服黃連敗毒丸

清心瀉氣飲 茯苓 防風 甘草 紫蘇 羌活

獨活 川芎 青皮 薄荷 黃芩 柴胡 荆芥

赤芍 麥冬 連翹 石膏 蔓荊子 右水煎服

黃連敗毒丸 黃連<sub>兩二</sub> 甘草<sub>兩一</sub> 連翹<sub>兩一</sub> 防風<sub>錢一兩五</sub>

羌活<sub>兩一</sub> 細辛<sub>兩一</sub> 薄荷<sub>錢五</sub> 黃芩<sub>兩一</sub> 兩酒 甘菊花<sub>兩一</sub>

右為細末煉蜜丸如梧子大每五十丸食後白湯下

搽藥 皂礬<sub>錢五</sub> 大粉草<sub>兩一</sub> 二味同煎濃膏加冰片

少許用鴨毛潤眼眶上即愈

發背毒



此毒受在手陽明經氣虛風熱上壅風毒成瘡當用清



心流氣飲次用內托流氣飲治之此症客于會合之前  
灌在閔後形如米粒漸次赤腫遍身潮熱  
清心流氣飲

茯苓 防風 甘草 柴胡 羌活 川芎 獨活  
紫蘇 連翹 赤芍 人參 白芷 前胡 山梔  
內托流氣飲

人參 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇 桔梗 枳殼  
烏藥 細辛 當歸 防風 川芎 白芷 鼠粘子  
芍藥 薑三片煎服 蠟茶九日進三四服

瘰癧



此瘰癧受在脾胃心肺熱氣結成毒也當用敗毒流氣飲

清肝流氣飲治之或醫緩之命亦難生矣慎之慎之  
敗毒流氣飲

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草 白芷 川芎 薄荷

生地 乾葛 麥冬 當歸 芍藥 柴胡 天花粉

鼠粘子 右水煎食後服

清肝流氣飲

桔梗 枳殼 甘草 防風 前胡 羌活 青皮

生地 黃芩 獨活 川芎 當歸 芍藥 茯苓

小柴胡 薑三棗一煎服 蠟礬丸時時服之

疔腮毒



此毒受在牙根耳聾通于肝腎氣血不流壅滯頰腮此

日本藥學雜誌 卷二  
是風毒症先用清肝流氣飲後用托裡流氣飲治之  
三

枳殼 桔梗 黃芪 前胡 羌活 甘草 石膏  
防風 川芎 芍藥 荊芥 白芷 生地 薄荷  
托裡流氣飲

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍 甘草 防風  
厚朴 烏藥 官桂 木香

薑三棗一煎服

患處用圍藥敷之

耳風毒



耳風毒受在心腎氣不流行壅在心經致傷于耳五種

耳痔耳聾耳壅耳濕耳爛可用清肝流氣飲後用定痛  
降氣湯治之如遇耳痔耳聾先用針刺破用紅玉膏點  
之耳脹痛用虎耳草汁滴入耳內痛即止耳疔以燒酒  
滴疔根上方得脫隨用苦茶洗解酒毒  
清肝流氣飲

枳殼 桔梗 黃芩 前胡 羌活 青皮 小柴胡  
薄荷 生地 烏藥 甘草 防風 川芎 白芷  
石膏 赤芍  
右用水煎服

定痛降氣湯

紫蘇

厚朴

陳皮

甘草

半夏

前胡

川芎

防風

芍藥

白芷

當歸

黃柏

知母

乳香

小柴胡

薑三片棗一枚煎服不拘時

若耳輪赤爛清涼膏貼之

耳脹痛

用江魚齒又名腦內骨火煨為末水調滴入耳內



耳門瘡  
耳根瘡



耳門癰 受在肝經毒氣傳注血不周流此是惡毒症也  
當用前藥治之

耳根癰 受在腎經絡怒氣傷心凝滯肝經風熱壅盛成  
毒也當用眉風藥治之

頰上者不為風 頰下者要成漏瘡此症不可輕易  
用眉風藥治之可也

用前清肝流氣飲活法施治之

發耳



其瘡生于耳邊又名熱毒發疽五六月間漸長如蜂窠  
皮紫者亦熱諸處如火燒痛不可忍十日可刺無膿者  
十一日死若瘡不硬刺見白膿者不死黃膿出者不死  
無時出鮮血者及赤膿者死食不知味多謊語者亦死  
在二十日之間便見凶吉

煎藥用千金內托散隨時增損之

項疽毒

三才圖會卷之三



此毒因五藏受毒氣壅血枯伏在風府之間惡症也當  
用敗毒流氣飲治之後用內托流氣飲

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

甘草

川芎

小柴胡

青皮

枳殼

防風

羌活

白芷

芍藥

當歸

連翹

獨活

右水薑三棗一煎服

後服內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

官桂

檳榔

烏藥

當歸

防風

白芷

芍藥

川芎

柴胡

煎同前

婦人加香附

夏天去官桂加麥冬

風毒頸癰



一人肥壯素能飲酒酷暑遠行酒醉居于舟中卧於風  
内又為日色暑氣相侵并有七情所干歸家不免于色  
慾頸項間忽痛如失枕之狀其名曰何乃風熱鎖喉毒  
也久則紅色透于肩背堅硬難消急服清暑疎風散  
清暑疎風散

羌活

防風

荊芥

升麻

甘草

乾葛

蒼朮

厚朴

川芎

當歸

白芍

獨活

白芷

桔梗

紫蘇

大柴胡

薄荷

薄桂

枳殼

蔓荊子



木香

葉本

水二鍾薑七片葱白三根濃煎熱服隨飲好酒以助藥力以衣覆患上出汗為要次用國藥并服千金托裏散加踈風清暑之劑

發願毒一名流注



此毒傷寒後餘毒不散汗發不透故發此疽在頭耳一

寸三分在心窩兩肋在身者可治在耳後相連咽喉恐  
毒氣內攻難進飲食藥餌臭流清膿兩耳閉塞者即死  
無即生用前二十四味流氣飲熱服以出其汗次服千  
金內托散

煎上用銀篋散將薑汁好醋加蜜火許和勻火上  
熬熱調藥搽四向空中山毒時用絲汁溫調之

桔梗 厚朴 白芷 防風 人參 黃芪 川芎

甘草 當歸 官桂 黃芩 白朮 煎服

不換金散

半夏 厚朴 蒼朮 陳皮 人參 藿香 茯苓  
木香 後再服乳香護心散 仍貼金絲膏

牙  
腮



一名骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名牙槽風  
此毒因憂思驚慮太陽受症結于大腸之間邪毒交生  
灌于經絡之內初起生于耳下及項間隱隱皮膚之內  
畧有小核漸長如李子之狀便覺紅腫或上或下或左  
或右牙關口噤不開急用鷲毛撚出風痰即服驅風破  
毒散立愈

驅風破毒散

白礬

巴豆

紅肉硝

草烏尖

猪牙皂角

猪牙皂角

薄荷

各等分

右為細末吹之

方

天麻 防風 草烏 草撥 細辛 乳香 川芎

朋砂 薄荷 射香 溫水嗽口或鼻內吹之

此症小兒亦生者其故何也稟氣虛弱感風寒暑熱相  
結成疳或恣食肥甘生冷甜物餘穢積成于牙縫不能  
滌洗去垢漸爛至臭膿血淋漓日久則氣血凝滯結成  
多骨而出甚至爛漫穿腮急用珍珠冰片散搽之

珍珠冰片散

珍珠 一錢 紅絨末 錢八中白 煨 枯礬 二錢 雞內金 煨存 性 錢

水片五分 射香二分 銅青一錢 青靛一錢 黃連末一錢  
孩兒茶錢 細牙茶一錢

右為細末先用蚌水繳淨患處每摻入之一日夜一  
二十次之方愈男婦亦然并服煎劑

清熱消疳散

乾葛	升麻	生草	貝母	黃連	黃芩	茯苓
桔梗	薄荷	防風	荊芥	羌活	青皮	牡丹皮
當歸	白芍	生地	鼠粘子	水二鍾	燈心三十莖	煎服
虛加人參	白朮	年久加草龍膽	熟加柴胡	前胡		


刻齋





此毒生于顏上不為風頰下要成漏瘡不可輕易常用  
敗毒流氣飲 再用內托清肝飲 二方見前  
圍藥同前

風毒



此毒氣血壅上結聚成毒常用以疔疽藥治之先用敗毒  
流氣飲後用清肝流氣飲治之

外用圍藥敷之

發鬚毒  
發此毒



此發鬚者脾胃虛熱心肺邪風上攻禾膠之端多在承

衆之側形如羊刺四邊腫硬痛楚難禁時流黃水麻痺  
增寒壯熱毒氣下流心胸主壯逆皆伏陽攻于心肺虛  
熱注于三焦內服當歸內托散外微擦破以神應散搽  
之

神應散

輕粉 一錢  
雞內黃 二錢  
射香 三分  
水片 三分  
黃柏末 二錢  
韶粉 二錢  
五倍末 一錢  
黃連 二錢

右為末先用甘草苦參豬蹄薄苛白芷防風荆芥煎  
湯洗淨拭乾將陳菜油豬膽汁調搽之

續發壽



此毒因腎經有熱水枯不能上潤于心火故發此毒急  
服人參敗毒散加五味子 千金肉托散 蠟礬丸每  
服五六十丸連進十餘服待疔軟頭黑替針九咬破不  
可用針刺若針刺瘡口出黃水四圍生細黃泡遍而遊  
走再用拔毒散圍四畔治法同發髭毒煎劑隨時施治

石疽



石疽雖與石癰同惟石疽深寒客于經絡血氣結聚不



散隱于皮內腫按之如石此毒連頸項之間內先潰爛  
方出皮膚恐髓出頸項者即死用排膿內補十宣散待  
膿盡內補散恋心乳香護心散仍貼金絲膏渴甚加五  
味天花粉乾葛麥冬烏梅初起須用艾火灸患上三四  
十壯發于額面者不可矣

煉石散 堅如石碗其色不變

鹿角

煨

白蘇

兩

粗厲黃石

仁

在鼎

好醋

五升

先燒石

通紅

再燒

再淬

醋盡

方止

為末

加二味

末將

剩

下醋調如泥塗上消軟灸處亦塗之

以方以商陸  
為碎處上

頰  
痘



此毒生于頰車之上多者皆出于附骨亦名附骨疽若不速治漸創其骨久後必致成漏終不能痊治方于後

內托散加

羌活

獨活

水煎服

次用十奇散加川椒

細辛

桔梗

青皮

外用圍藥搽之

蒲晴齋



五桂堂精選三卷

四

夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌于瞳人  
初生疼痒漸成膿水其色如疳日久睛昏氣敗肝絕難  
救之症慎之慎之

先服黃芪當歸川芎生地白芍黃芩薄荷荊芥連翹白  
芷升麻桔梗天花粉之類

次用黃連地骨皮當歸煎湯溫洗

治方闕要惟補腎宜肝為念學者宜參詳之不可輕  
視之也

鴉  
喙  
瘡



鴉喙者久中邪熱臟腑虛寒血氣衰少腠理不密發于皮膚之上相生如錢竅後爛似鴉喙日久將來損傷難治小兒同前其治法用陰蝕瘡之藥治之

鴉喙散

老鴉毛

燒灰

大紅絨

燒灰

珍珠

五分

冰片

一分

枯礬

五分

輕粉

三分

黃丹

一錢

射香

少許

右為細末先用苦茶洗淨乾摻其煎劑以意加減用之

癰唇

此症生在唇上





繭唇者此症生于嘴唇也其形似蚕繭故名之內經云脾氣開于口又云脾之榮在唇但燥則乾熱則裂風則瞶寒則揭若腫起白皮皴裂如蚕繭故定名曰繭唇也始起一小瘤如豆大或再生之漸漸腫大合而為一約有寸厚或翻花如楊奔如疣瘡如灵芝如菌形狀不一皆由六氣七情相感而成或心思太過憂慮過深則心火焦熾傳授脾經或食醪酒厚味積熱傷脾而腎水枯竭以致之須審其病症之因惟補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消矣此

亦異症所生者少人亦難曉若久不愈者急用金銀  
銻銕在文火內燒紅盪之內服歸脾養榮湯庶易愈  
矣若外用追蝕惡毒線結之法反為所傷慎哉慎哉  
昔婦人患此陰血衰少故也宜用四物逍遙散治之  
歸脾養榮湯

當歸 川芎 白芍 生地 茯苓 陳皮 小柴胡

甘草 麥冬 升麻 山梔 桔梗 黃芪 白朮

防風 黃連 牡丹皮 黃柏 知母 婦人加澤蘭香

附玄胡索

烙銕法



不拘金銀打成烙鉄每用艾  
火焚燒通紅乘熱溫患上丹  
灸非溫一日止可五六次恐傷元氣須要擇上吉日不犯鬼神  
溫畢隨將藥搽之庶不再生矣

除根搽藥

莧菜明乾燒銅青系枯九系輕粉系雄黃系雞內金系

射香系孩兒茶系右為細末麻油調搽明日再

用甘草湯洗淨再烙如前以平為度後用生肌散

花蘆石醋煨孩兒茶系雞內金系飛丹煨水飛乳香系

血竭系紅絨灰系黃連系右為細末加水片一分乾

重校始祖宋竇太師瘡瘍經驗全書二卷畢